



Petit pays d'Amérique du sud dont la cordillère des Andes le traverse du nord au sud. Il est limité par le Pérou le long d'une frontière de 1 420 km) et par la Colombie sur 590 km), et l'océan Pacifique (à l'ouest). Le territoire équatorien comprend également les îles Galápagos (archipels volcaniques classés patrimoine de l'humanité pour la diversité de ses espèces).



Ce territoire possède aussi bien de la forêt tropicale humide (la plus grande concentration de rivières par km<sup>2</sup> dans le monde). que des hauts sommets (Mont Chimborazo de 6300 m !)

## Équateur

15 millions d'habitants  
Capitale : Quito  
Langue : espagnol



# Atèle de Colombie

(*Ateles fusciceps robustus*)

Qui est-il ?



FAMILLE : atelidae  
TAILLE : 40 à 50 cm (corps)  
QUEUE : 70 à 80 cm  
POIDS : 5 à 9 kg  
Statut de protection :  
II (CW) B (UE)



C'est un singe du Nouveau monde entièrement noir et donnant l'impression d'avoir 5 membres.

On l'appelle aussi Singe araignée. La queue est plus longue que le corps et possède la faculté de préhension presque aussi bonne que la main ou le pied. L'atèle peut aisément rester suspendue à une branche par cette queue dont l'extrémité est pourvue d'une peau épaisse ressemblant à la paume d'une main ou au-dessous du pied.

Sa face est un peu plus claire et parfois ses yeux sont bleus.

Où vit-il ?

Dans la forêt tropicale côtière d'une zone allant de l'Equateur au Panama en passant par la Colombie. C'est un singe arboricole qui occupe plutôt les strates supérieures de la forêt primaire qui ne sait pas vivre en milieu dégradé, étant vulnérable au sol.

! C'est un des rares singes avec le chimpanzé à pratiquer la **fission-fusion** c'est-à-dire que le groupe de base composé d'une vingtaine d'individus se disperse le matin, en petits groupes de 4 à 8 pour chercher la nourriture, avant de se rassembler le soir.

Le lien qui unit la mère à son petit est très fort et les mâles ont tendance à rester au sein du groupe toute leur vie, ce sont plutôt les jeunes femelles adultes qui se dispersent.

! La queue (dite préhensile), souple et sensible, est utilisée comme une véritable main. Il s'en sert pour s'accrocher aux branches, mais également pour ramasser des fruits et les porter à la bouche.



Brown-headed Spider Monkeys are found in the rainforests. have long, narrow limbs and a prehensile tail that is used as a fifth limb to swing between branches as they forage for food. Their tail is much longer in length than their body. Only the female cares for her young, until it is weaned at 20 months. Male brown-headed spider monkeys live in their natal groups for their entire life. Females will disperse at adolescence. They prefer ripe fruits and leaves, but will eat nuts, seeds, insects, and sometimes eggs. The climate of the rainforests in which they live ensures an abundant supply of food year-round, allowing them to be able to reside in the same area throughout the year